

令和4年度病害虫発生予察情報

予報第14号（2月）

令和5年2月15日
発表：福島県病害虫防除所

1 野菜・花き

| 作物名 | 病害虫名 | 地方 | 発生時期 | 発生量 | 予報の根拠 | 防除上注意すべき事項 |
|-----|--------|-----|------|-------|----------------------|---|
| イチゴ | うどんこ病 | 全 域 | — | やや少ない | 発生ほ場割合は、平年より低かった（—）。 | 多発すると防除が困難になるので、発生初期から薬剤防除を実施する。 |
| | 灰色かび病 | 全 域 | — | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。 | 過湿にならないよう換気を行う。 発病果や罹病した果梗、老化葉などはハウス内に放置しない。 |
| | アブラムシ類 | 全 域 | — | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。 | 低密度時から薬剤防除を実施する。 |
| | ハダニ類 | 全 域 | — | やや多い | 発生ほ場割合は、平年より高かった（+）。 | 低密度時から防除を徹底する。 薬剤感受性が低下しやすいので、薬剤の効果を確認し、気門封鎖剤も含めて系統の異なる薬剤をローテーション散布する。 天敵製剤（ミヤコカブリダニ、チリカブリダニ）を放飼している場合は、ハダニ類の発生状況に応じて、天敵に影響の小さい薬剤を選択する。 |
| | コナジラミ類 | 全 域 | — | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。 | 排泄物に発生するすす病は果面の汚れによる品質低下を招くので、発生密度に注意し、薬剤防除を実施する。 |
| | アザミウマ類 | 全 域 | — | 平年並 | 発生ほ場割合は、平年並であった（±）。 | 発生が多くなると果実被害が生じるので、低密度時から防除を実施する。 |

注) 予報の根拠の中で（+）は多発要因、（-）は少発要因、（±）は平年並要因であることを示す。

○注意が必要な病害虫

| | |
|-----|--|
| イチゴ | ■萎凋病、萎黄病、炭疽病 <p>これらの病害を防ぐためには、まず無病地からの採苗、育苗を徹底することが基本的対策となるため、ほ場で発病が確認されている場合は次年度に向けて以下の対策を実施してください。①育苗用土壌やポット等の資材を一斉に更新する。②炭疽病は水媒伝染するため、親株を育苗する際は高設育苗を行うとともに、頭上からの灌水を避ける。③発病株、または発病が疑われる株は、見つけしだいその周囲の株と土を含めて丁寧に抜き取り、適切に処分する。④これらの病気が発生したほ場で連作せざるを得ない場合は、土壌消毒を実施する。</p> <p>なお、イチゴの土壌病害の簡易検定方法について、病害虫防除所ホームページの病害虫ライブラリー（野菜花き類の病害虫、イチゴの病害）に掲載しているので参考にしてください。</p> <p>URL : https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/433111.pdf</p> |
|-----|--|