

# 南会津地域感染症通信3月号

調査対象期間7週～12週(2月13日～3月26日)

令和5年3月  
南会津保健所  
電話 0241-63-0306



【新型コロナウイルス感染症について】新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は減少傾向にあります。3月13日よりマスク着用のルールは見直されましたが、感染対策が不要になったわけではありません。感染リスクや重症化リスクを正しく理解し、マスク着用が効果的な場面などでは引き続き着用することが**推奨**されます。

## マスク着用が効果的な場面

医療機関に行くとき 高齢者施設に行くとき



混雑した乗り物の中



## 症状がある方

外出を控えましょう。  
通院等やむを得ず外出するときはマスクを着用。



## 重症化リスクがある方

### 妊娠中の方

感染流行期に混雑した場所へ行く場合はマスクを着用。

## 事業者から呼びかけられたとき

事業者が感染対策上の理由等により利用者又は従業員にマスク着用を求める場合があります。

\* \* \* \* \*



## 〈今月のトピックス〉 HPV ワクチンについて

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。小学校6年生～高校1年生相当の女の子を対象に、公費によりワクチン(HPVワクチン)の接種を受けることができます。

現在ワクチンの種類は、**2価ワクチン(サーバリックス<sup>®</sup>)**、**4価ワクチン(ガーダシル<sup>®</sup>)**、**9価ワクチン(シルガード<sup>®</sup>・9)**の3種類あります。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。



3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1 1回目と2回目の接種は、通常5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2-3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4-5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。



HPV ワクチンの効果やリスクについて  
詳細は、厚生労働省ホームページへ

厚労省 HPV