

世界に誇れる極上の会津米づくり「目指そう 今年も特A 会津コシ1等米100%」

# 両沼地方稻作情報 第1号

令和5年4月7日

発行：福島県会津農林事務所会津坂下農業普及所 （電話0242-83-2112）  
” 金山普及所 （電話0241-54-2801）

J A会津よつば 各営農経済センター、(有)カネダイ、(有)猪俣徳一商店、(有)山一米穀店、  
会津宮川土地改良区、阿賀川土地改良区、会津坂下町只見川土地改良区



QRコード

会津坂下農業普及所のHPでは、これまで発行した稻作情報を掲載しております。  
その他、様々な情報を発信しておりますので、お気軽にご覧ください。

URL : <https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36243a/bangehukyu-9.html>

- 丁寧な種子予措により良好な催芽種子を確保しましょう。
- 催芽機やハウス内の温度管理を徹底しましょう。
- 灌水は原則午前中に行いましょう。
- ばか苗病の防除にご協力お願いします。（詳しくは裏面参照）

## 1 気象情報（気象庁 東北地方 1か月予報（04/08～05/07））

期間の前半は、気温がかなり高くなる可能性があります。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。平均気温は、高い確率60%です。

## 2 健苗育成のポイント（種子予措～育苗）

### （1）塩水選（良い種子を選ぶ）

- ・収量、品質向上、病害虫防除の基本的な対策です。
- ・購入種子でも塩水選を実施します。

表1 塩水選用の塩水の作り方(水10ℓ当り)

	比重	食塩	硫安(21%)
うるち	1.13	2.1kg	2.7kg
もち	1.10	1.6kg	2.0kg

### （2）浸種

- ・水温は10～15°Cとし、十分な水量を確保します。
- ・種子の発芽揃いを良くするため、積算水温（水温×日数）で100～120°Cを目安に浸種を行います。
- ・酸欠防止のため、定期的（2日に1回程度）に水を交換します。

### （注）浸種時の水温上昇について

- ・昨年は、4月前半に高温となり、浸種中に芽が動いてしまう事例が見られました。
- ・今年も気温上昇が予想されるため、水温をしっかりと確認して浸種しましょう。

### （3）催芽

- ・温度は28°Cとします。
- ・28°C以上では、もみ枯細菌病のリスクが増加します。
- ・休眠が深い種子もあるため、発芽状況をよく確認します。

### （4）播種

- ・発芽不良や覆土持ち上がりの恐れがあるため、覆土後は灌水しません。

### （5）出芽（育苗器）

- ・催芽と同様、温度は28°Cとします。
- ・芽の伸びすぎに注意し、出芽率80～90%、芽の長さ5～10mmを目安に緑化へ移行します。




図1 正しいハト胸催芽もみ

## (6) 緑化（稚苗・施設内）

- ・緑化温度は日中25°C、夜間12~15°C、緑化期間は2~3日が目安です。
- ・糞が露出した場合は覆土の手直しをしましょう。
- ・28°C以上の高温や加湿を避け、強い光に急に当たないように管理します。

## (7) 硬化（稚苗・施設内）

- ・硬化温度は日中20°C、夜間10~15°Cが目安です。
- ・灌水は1日1回午前を基本とし、午後の灌水は床土が乾燥しすぎている場合に行います。
- ・夕方以降の灌水は苗の軟弱徒長の原因になります。

温度計は苗と同じ高度の気温を測定します。



図2 育苗中の温度計の位置

### ④ 温度管理について

- ・古い催芽機では設定温度と実際の温度がズレる場合があります。使用前に温度計で確認しましょう。
- ・小さなハウスは室温が上昇しやすいため、小まめに温度管理を行いましょう。

## 3 ばか苗病防除のお願い

近年、ばか苗病の発生が拡大しています。会津坂下農業普及所管内では、県農業総合センター会津地域研究所で水稻の原種を生産するとともに、湯川村で生産者へ供給される種子を生産しています。ばか苗病の蔓延は種子生産に深刻な影響を及ぼし、ひいては県内全ての水稻生産者への種子供給に支障が生じます。以下の点に留意し、適切なばか苗病防除をお願いします。

### (1) 種子の適切な管理

- ・消毒済み種子を使用、または適切な種子消毒を必ず行ってください。
- ・塩水選を実施してください。
- ・種糞の床へのべた置きは避け、伝染源となる稻わら、糞殻、粉塵等を除去してください。
- ・前年にばか苗病が発生した場合は、あらかじめ育苗箱や育苗器等の洗浄・消毒を実施してください。



図3 ばか苗病(育苗時)  
水の作り方(水10ℓ当り)

### (2) 育苗時の管理

- ・ばか苗は、育苗の中～後期になると葉身が徒長し黄化します。
- ・発見した場合は、株ごと抜き取るか、箱ごと廃棄してください。
- ・抜き取った罹病苗も感染源となるため、土中に埋却する等、適切に処分し、ハウスや場内に放置しない。



図4 ばか苗病(本田)  
水の作り方(水10ℓ当り)

### (3) その他

- ・罹病苗を本田に移植すると、ほとんどは枯死しますが、一部は生存します。
- ・罹病株からばか苗病菌の胞子が数百メートル以上飛散し、汚染源となります。
- ・本田での汚染を防ぐため、種子予措から育苗の段階で適切に防除してください。

○農薬はラベル等を確認し、適切に使用してください

○通水のために水路の土砂上げ、草刈り、ビニールゴミ等の撤去をお願いします。

○農業保険に加入しましょう。

農作業安全運動実施中！

4/1~5/31

安全な農作業を心掛けよう！

