

福島県慣行使用基準

(1) 穀類

作物名	地帯・作型	品種区分等	たい肥を除く施肥窒素量 (作期当たり)				節減対象農薬使用回数(作期当たり)※成分数													目標収量 (kg/10a)	本ほでの 栽培期間 (月)	たい肥投 入量の目 安(t)	備考	
			育苗	基肥	追肥	合計	種子消毒				育苗中における使用回数				本ほにおける使用回数									
							殺菌	殺虫	補調	小計	殺菌	殺虫	補調	小計	土消	除草	殺菌	殺虫	補調					小計
水稻	移植栽培	浜通り・中通り 平坦	コシヒカリに準ずる品種(注1)	4.0	2.0	6.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	500	5-11	1.0		
			ひとめぼれに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	560	5-10	1.0		
			天のつぶに準ずる品種(注1)	8.0	2.0	10.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	600	5-10	1.0		
		会津平坦	コシヒカリに準ずる品種(注1)	4.0	2.0	6.0	2			2	3			3	4	4	3	11	16	540	5-10	1.0		
			ひとめぼれに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2	3			3	4	4	3	11	16	600	5-10	1.0		
			天のつぶに準ずる品種(注1)	8.0	2.0	10.0	2			2	3			3	4	4	3	11	16	650	5-10	1.0		
	山間・山沿い (注2)	ひとめぼれに準ずる品種(注1)	7.0	2.0	9.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	540	5-10	1.0			
		里山のつぶに準ずる品種(注1)	8.0	2.0	10.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	540	5-10	1.0			
		まいひめに準ずる品種(注1)	10.0	2.0	12.0	2			2	3			3	4	5	3	12	17	600	5-10	1.0			
	湛水直播栽培	浜通り・中通り 平坦	コシヒカリに準ずる品種(注1)	4.0	2.0	6.0	2			2				0	6	5	3	1	15	17	480	4-10	1.0	
			ひとめぼれに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2				0	6	5	3	1	15	17	510	4-10	1.0	
			天のつぶに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2				0	6	5	3	1	15	17	600	4-10	1.0	
会津平坦		コシヒカリに準ずる品種(注1)	4.0	2.0	6.0	2			2				0	6	4	3	1	14	16	510	5-10	1.0		
		ひとめぼれに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2				0	6	4	3	1	14	16	540	5-10	1.0		
		天のつぶに準ずる品種(注1)	6.0	2.0	8.0	2			2				0	6	4	3	1	14	16	650	5-10	1.0		
山間・山沿い	ひとめぼれに準ずる品種(注1)	7.0	2.0	9.0	2			2				0	6	5	3	1	15	17	480	4-10	1.0			
	まいひめに準ずる品種(注1)	10.0	2.0	12.0	2			2				0	6	5	3	1	15	17	540	5-10	1.0			
	乾田直播栽培	浜通り・中通り 平坦	ひとめぼれに準ずる品種(注1)	4.0	6.0	10.0	2			2			0	7	3	4	14	16	480	4-10	1.0			
会津平坦	ひとめぼれに準ずる品種(注1)	4.0	6.0	10.0	2			2				0	7	2	4	13	15	480	4-10	1.0				
	天のつぶに準ずる品種(注1)	4.0	6.0	10.0	2			2				0	7	2	4	13	15	650	4-10	1.0				
	乾田直播栽培	会津平坦	ひとめぼれに準ずる品種(注1)	4.0	6.0	10.0	2			2			0	7	2	4	13	15	650	4-10	1.0			
麦類	浜通り・中通り・会津平坦 (積雪期間90日未満の地域) (注5)	きぬあずまに準ずる品種等	10.0	3.0	13.0	2			2			0	3	3	1	7	9	500	10-7	2.0				
		さとのそらに準ずる品種等	4.0	10.0	14.0	2			2				0	3	3	1	7	9	500	10-7	2.0			
		ゆきちからに準ずる品種等	10.0	10.0	20.0	2			2				0	3	3	1	7	9	500	10-7	2.0			
	会津山間・山沿い (積雪期間90日以上地域)	きぬあずまに準ずる品種等	10.0	3.0	13.0	2			2			0	3	4	1	8	10	450	10-7	2.0				
ゆきちからに準ずる品種等		10.0	10.0	20.0	2			2			0	3	4	1	8	10	450	10-7	2.0					
大豆	全域		2.0	6.0	8.0	1	1	2				0	4	2	3	9	11	300	5-11	2.0				
ソバ	全域		2.0		2.0			0				0	0	0	0	0	0	100	夏4-8 秋7-11	0.3				
小豆	全域		3.0		3.0			0				0	1	1	3	5	5	150	5-11	1.0				
エゴマ	全域		3.0		3.0			0				0	0	0	0	0	0	100	6-10	0.3				
ベニバナインゲン(はなまめ)	全域		4.0	2.0	6.0			0				0	0	0	4	4	4	600	4-10	2.0				
ナタネ	全域		10.0	4.0	14.0			0				0	0	0	0	0	0	200	9-6	1.0				
ラッカセイ	全域		3.0	2.0	5.0	1		1				0	2	3	3	8	9	300	5-10	1.0				

(注1) コシヒカリ、ひとめぼれ、天のつぶ、里山のつぶ、まいひめに準ずる品種は別表1に示すとおりとする。

(注2) 水稻における山間・山沿い地帯は別表2に示すとおりとする。

(注3) カメムシ多発地域(別表3)、ニカメイチュウ多発地域(別表4)、イネヒメハモグリバエ多発地域(別表5)、直播栽培におけるイネツトムシ多発地域(別表6)、難防除雑草発生地区に該当する場合、標準の化学農薬使用回数については、該当するそれぞれにつき化学農薬使用回数を1回加えた合計とする。

(注4) コーティング作業時の苗立安定のための化学合成農薬使用回数(2回)を含む。

(注5) 麦類の積雪期間90日未満の地域については、別表7に示すとおりとする。

(注6) 水稻・大豆での基肥一発施肥の場合は、基肥と追肥の総量を基肥とする。